

Baza čierna – Black elder

DANA

Sambucus nigra L

stredne skoro dozrievajúca, úrodná odrôda

medium-early ripening yielding variety



Pôvod: Vznikla v r. 2001 z kríženia Výber č. 17 x Sambo vo Výskumnom ústave ovocných a okrasných drevín, a.s. Bojnice.

Rastlina: Kríky sú vzrastné, hustejšie. Majú vzpriamenejší vajcovitý habitus.

Plody: Kôstkovičky sú čiernej farby, strednej veľkosti (5,5 – 6,0 mm), so stredne pevnou dužinou. Plody dozrievajú stredne skoro v druhej polovici augusta. Sú dobrej kyslastej chuti bez pachute. Súplodie je stredne ľažké s priemernou váhou súplodia 64 g.

Pestovateľské vlastnosti: Nemá špeciálne požiadavky na pôdne a klimatické podmienky. Môže sa pestovať vo všetkých ovocinárskych oblastiach.

Je čiastočne samoopolivá. Rovnomernosť dozrievania plodov v súplodí i v kríku je veľmi dobrá.

Odolnosť voči chorobám: Nie je mimoriadne citlivá na výskyt hubových chorôb a škodcov.

Využitie: V čerstvom stave sa plody nekonzumujú. Plody sú cennou surovinou na výrobu prírodného antokyanového farbiva.

Origin: It was raised from crossing Selection N.17 x Sambo in Research Institute of Fruit and Decorative Trees Bojnice in 2001.

Plant: The shrubs are full-grown, thicker. They have upright, egg habit.

Fruits: Little stone-fruits are black coloured, medium-sized (5.5 – 6.0 mm), with a medium-solid flesh. The fruits ripen medium-early in the second half of August. They have a good sourish taste without any smack. The co-fruit is moderately heavy with an average co-fruit weight of 64 g.

Growing characteristics: It does not have any special requirements for soil and climatic conditions. It can be grown in all localities for fruit growing. It is partly self-pollinated. The equability of fruits ripening in the co-fruit and shrub is very good.

Resistance to disease: It is not sensitive to fungal diseases and insects occurrence.

Use: The fruits are not consumed in fresh. They are valuable resource for the production of natural anthocyanin pigment.